

VACCINAZIONE MENINGOCOCCO B NELLA AZIENDA USL CENTRO TOSCANA

VACCINAZIONE GRATUITA:

A chi può essere fatta 1) Ai soggetti nati dopo il 1/1/2014
2) Ai soggetti a rischio di infezione invasiva (vedi sotto)

Dove può essere fatta: 1) dal proprio Pediatra di Famiglia
2) per gli assistiti dei Pediatri che non aderiscono alla vaccinazione, alla ASL o presso altro Pediatra di Famiglia che ha aderito alla vaccinazione (l'elenco è reperibile nel sito della ASL 10 di Firenze (www.asf.toscana.it))

VACCINAZIONE IN CO-PAGAMENTO

A chi può essere fatta: Ai soggetti non a rischio, nati prima del 1/1/2014

Dove può essere fatta: 1) dal proprio Pediatra di Famiglia, con il pagamento di 69,65 euro a dose,
2) per gli assistiti dei Pediatri che non aderiscono alla vaccinazione:
- alla ASL previo pagamento di 69,65 euro a dose
- presso altro Pediatra di Famiglia che ha aderito alla vaccinazione (l'elenco è reperibile nel sito della ASL 10 di Firenze (www.asf.toscana.it))

REGISTRAZIONE DELLE VACCINAZIONI:

Le vaccinazioni effettuate vanno inviate mensilmente a: registrazione.vaccinazioni@asf.toscana.it

DOVE RITIRARE I VACCINI:

ZONA	Farmacista	N° telefonici	e-mail
Zona Mugello	Riccardo Silvano	055 8451382/357	riccardo.silvano@asf.toscana.it
Zona sud-est:	Lorenzo Bencivenni	055 6936455/392	lorenzo.bencivenni@asf.toscana.it
Zona nord-ovest	Annalisa Benini	055 6932523/529	annalisa.benini@asf.toscana.it
Zona Firenze SMN	Guia Croppi	055 6938842/804	guia.croppi@asf.toscana.it
Zona Firenze S.SALVI	Luca Luminati	055 6933557/558	luca.luminati@asf.toscana.it

Soggetti a rischio di infezione invasiva (vaccinazione gratuita)

- talassemia e anemia falciforme
- asplenia post-traumatica
- altre cause di asplenia
- condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d'organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia sistemica corticosteroidica ad alte dosi)
- diabete mellito tipo 1
- malattie polmonari croniche
- insufficienza renale cronica con creatinina clearance <30 ml/min
- alcolismo cronico
- infezione da HIV
- immunodeficienze congenite
- malattie epatiche croniche gravi
- perdita di liquido cerebrospinale
- difetti congeniti delle frazioni terminali del complemento (C5 – C9)
- difetti dei toll like receptors di tipo 4
- difetti della properdina
- altre patologie con difetto dell'immunità innata
- trapiantati o candidati al trapianto
- riceventi fattori della coagulazione concentrati
- situazione epidemiologica ad alto rischio su valutazione dell'ISP della ASL.