

ANAMNESI PRE VACCINALE

Cognome Nome Nato a Il

Ha in atto una malattia acuta con o senza febbre?	NO	SI	<i>Precauzione: vaccinare dopo la guarigione clinica (in caso di varicella e morbillo aspettare 1 mese)</i>
Presenza di anamnesi personale o familiare positiva per convulsioni febbrili?	NO	SI	<i>Precauzione Separare MPR e Varicella (anche nella stessa seduta)</i>
È affetto da una malattia con deficit immunitari?	NO	SI	<i>Alcuni deficit Immunitari controindicano la somministrazione di vaccini con virus vivi e attenuati. Utile una consulenza</i>
È stato sottoposto a terapie immunosoppressive? <ul style="list-style-type: none"> • cortisonici (<i>ad alte dosi, > 2 mg/kg/die di prednisone, per almeno 15 giorni continuativi</i>), • antineoplastici • farmaci biologici • terapie radianti • trapianto di midollo 	NO	SI	<i>Controindicazione temporanea per la somministrazione dei vaccini con virus vivi e attenuati, attendere:</i> <ul style="list-style-type: none"> • 1 mese per terapia cortisonica • 3 mesi per antineoplastici, farmaci biologici, terapia radiante o trapianto di midollo <i>I vaccini che non contengono virus vivi e attenuati rispondono meno, ma si possono fare</i>
Nell'ultimo anno ha ricevuto una trasfusione di sangue o somministrazione di immunoglobuline?	NO	SI	<i>Controindicazione temporanea per la somministrazione dei vaccini contenenti virus vivi e attenuati, attendere</i> <ul style="list-style-type: none"> • 6 mesi per la trasfusione di sangue • 11 mesi per somministrazione di Immunoglobuline
Ha avuto episodi di anafilassi ad alimenti, farmaci o vaccini?	NO	SI	<i>Precauzione: effettuare la vaccinazione in ambiente protetto in caso di episodi di anafilassi, indipendentemente dalla causa</i>
Ha avuto reazioni dopo altre vaccinazioni effettuate?	NO	SI	<i>Orticaria; se generalizzata e insorta entro 1 ora dal vaccino: effettuare la vaccinazione in ambiente protetto</i> <i>Febbre superiore a 40°</i> <i>Precauzione: non fare insieme tutti i vaccini somministrati nella seduta che ha provocato la Febbre</i> <i>Encefalite entro 1 settimana dalla somministrazione del vaccino: Controindicata la vaccinazione in causa</i> <u><i>Non controindicano le vaccinazioni:</i></u> <ul style="list-style-type: none"> • La sindrome di Guillain-Barré • Sindrome ipotonia-iporesponsività
Deve effettuare interventi chirurgici?			<i>Intervallo di 12 giorni dalla vaccinazione del Morbillo Intervallo di 48 ore per tutte le altre vaccinazioni</i>

Non rappresentano controindicazioni alla vaccinazione*:

1. presenza di tosse e raffreddore;
2. presenza di dermatiti infettive o di dermatosi;
3. convalescenza di malattie infettive;
4. uso di antibiotici;
5. uso di cortisone locale o per via generale a bassi dosaggi (< 2 mg/kg/die di prednisone)
6. recente anestesia;
7. *presenza di malattia neurologica (eccetto encefalite insorta entro 1 settimana dopo un vaccino);*
8. esposizione a malattia infettiva o prevenibile con vaccino;
9. storia personale o familiare di atopia;
10. storia personale o familiare di allergia ad antibiotici non contenuti nel vaccino;
11. storia personale o familiare di allergia all'uovo;
12. Eventi avversi benigni ad una precedente vaccinazione
13. storia familiare di reazioni avverse ad un vaccino;
14. storia familiare di SIDS (morte in culla);

Firma dell'operatore

Data

* Per valutare la possibilità di vaccinare in presenza di patologie o per somministrazione di farmaci, consultare la "Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni" dell'Istituto Superiore di Sanità.

Tabella equivalenza steroidi

Conversione degli Steroidi

Idrocortisone	20	40	60	80	100	120	140	160	200	400	625	2.500	5.000	10.000
Prednisone	5	10	15	20	25	30	35	40	50	100	156	625	1.250	2.500
Prednisolone	5	10	15	20	25	30	35	40	50	100	156	625	1.250	2.500
Triamcinolone	4	8	12	16	20	24	28	32	40	80	125	500	1.000	2.000
Metilprednisolone	4	8	12	16	20	24	28	32	40	80	125	500	1.000	2.000
Betametasone	0.75	1.5	2.25	3	3.75	4.5	5.25	6	7.5	15	23.5	94	188	375
Desametasone	0.7	1.5	2.25	3	3.75	4.5	5.25	6	7.5	15	23.5	94	188	375
Deflazacort	6	12	18	24	30	36	42	48	60	120	188	750	1.500	3.000

Idrocortisone Flebocortid	20	40	60	80	100	120	140	160	200	400	625	2.500	5.000	10.000
Prednisone Deltacortene	5	10	15	20	25	30	35	40	50	100	156	625	1.250	2.500
Prednisolone	5	10	15	20	25	30	35	40	50	100	156	625	1.250	2.500
Triamcinolone Ledercort	4	8	12	16	20	24	28	32	40	80	125	500	1.000	2.000
Metilprednisolone Depo-Medrol Solu-Medrol Medrol Urbason	4	8	12	16	20	24	28	32	40	80	125	500	1.000	2.000
Betametasone Bentelan Celestone	0.75	1.5	2.25	3	3.75	4.5	5.25	6	7.5	15	23.5	94	188	375
Desametasone Soldesam	0.7	1.5	2.25	3	3.75	4.5	5.25	6	7.5	15	23.5	94	188	375
Deflazacort Flantadin Deflan	6	12	18	24	30	36	42	48	60	120	188	750	1.500	3.000